

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

DLP 28-5-73 530248

EDITION DE LA STATION DES PAYS DE LA LOIRE ANGERS

(MAINE & LOIRE, LOIRE-ATLANTIQUE, SARTHE, VENDÉE, MAYENNE)

Régisseur de recettes de la D.D.A. - Protection des Végétaux-Cité Administrative rue Dupetit-Thouars - 49043 ANGERS CEDEX  
C. C. P. Nantes 86-04-02

Tél. 88.56.15

88.06.15

ABONNEMENT  
ANNUEL

30 Frs

SUPPLEMENT N° 2 au BULLETIN N° 152 de MAI 1973 -	VENDEE.....	p. 22
	SARTHE - MAYENNE.....	p. 24
SUPPLEMENT N° 3 au BULLETIN N° 152 de MAI 1973 -	MAINE-et-LOIRE.....	p. 23
	LOIRE ATLANTIQUE.....	p. 25

## VIGNE

OIDIUM - Les précipitations abondantes ont été défavorables au développement de cette maladie dont les manifestations demeurent encore très rares. Toutefois, l'humidité actuelle et l'élévation des températures créent des conditions plus propices au développement de ce parasite.

Par conséquent, sur tous les cépages sensibles à l'Oïdium, il est conseillé d'effectuer une première application dès maintenant.

MILDIU - Vignobles de la Loire Atlantique et de Muscadet de Maine et Loire - Il se confirme que le Mildiou existe en quelques endroits. Il y a donc lieu de terminer de toute urgence le traitement conseillé dans le supplément N° 2 au Bulletin de Mai.

- Autres vignobles - Le Mildiou demeure encore extrêmement rare. Toutefois, les récents orages ont pu assurer localement des recontaminations dont les manifestations devraient être visibles dans le courant de la semaine du 28 Mai au 2 Juin.

Par conséquent, dans les parcelles de vigne où un traitement contre l'Oïdium est envisagé par pulvérisation, il est conseillé d'ajouter un fongicide anti-mildiou à la bouillie anti-oïdium.

Par contre, dans les parcelles où l'Oïdium sera combattu par un poudrage, on peut encore attendre pour intervenir contre le Mildiou. De nouvelles indications seront données très prochainement par la Station.

Il est rappelé que pour éviter la formation de foyers primaires et leur extension, il convient d'éliminer les pousses basses oubliées au cours de la taille et d'assurer l'écoulement de l'eau après les pluies.

VERS DE LA GRAPPE - Dans tous les vignobles, le vol est commencé depuis plusieurs jours et des pontes localement abondantes ont déjà été déposées. Il est cependant encore trop tôt pour intervenir. La Station donnera très prochainement de nouvelles informations.

ARAIGNEE ROUGE - Très localement, des infestations assez fortes sont observées. Elles se traduisent par un retard dans la végétation, des feuilles petites, grisâtres, à nervures saillantes. Les acariens sont visibles à la face inférieure des feuilles.

Dans les parcelles où ces symptômes sont observés, il est nécessaire d'intervenir immédiatement.

## ARBRES FRUITIERS

TAVELURE DU POIRIER - Les projections d'ascospores sont moins nombreuses. Elles se poursuivent toutefois et des contaminations primaires pourraient encore se produire si de nouvelles pluies intervenaient. D'autre part, des taches apparaissent et vont continuer à apparaître. Enfin, la végétation demeure toujours très active. Par conséquent, dans les vergers de toutes les régions où un traitement a été exécuté dans les derniers jours de la semaine du 14 au 19 Mai, conformément aux indications de la note du 15 Mai, il y a lieu d'exécuter un nouveau traitement dès les premiers jours de la semaine du 28 Mai au 2 Juin. Par contre, dans les vergers où un traitement aura été exécuté plus récemment

VENDEE.....	p. 23
SARTHE - MAYENNE.....	p. 25
MAINE et LOIRE.....	p. 24
LOIRE ATLANTIQUE.....	p. 26

à la suite des pluies, ce qui est le cas le plus général, cette nouvelle application pourra être repoussée aux derniers jours de la semaine du 28 Mai au 2 Juin.

TAVELURE DU POMMIER - Les conditions sont identiques à celles qui existent pour la tavelure du poirier. Un nouveau traitement devra donc être exécuté dans les vergers de pommiers de toutes les régions, dans les derniers jours de la semaine du 28 Mai au 2 Juin. Toutefois, si des pluies importantes survenaient d'ici là, la protection devrait être renouvelée immédiatement.

CARPOCAPSE - Le vol est commencé dans la plupart des régions. Il est cependant encore trop tôt pour intervenir.

OIDIUM DU POMMIER - Cette maladie devient à nouveau plus virulente. Sur les variétés sensibles, les arboriculteurs auront intérêt à ajouter un fongicide anti-oidium à la bouillie destinée à combattre la tavelure.

ARAIGNEE ROUGE - Les conditions climatiques ont été peu favorables au développement de ce parasite dont l'activité demeure faible actuellement.

PUCERONS DIVERS - Des foyers existent localement dans les vergers. Les arboriculteurs auront intérêt à surveiller ces parasites et à intervenir si leur présence est décelée.

DIDYMELLA DU FRAMBOISIER - Renouveler la protection dès que possible.

Le Chef de la Circonscription Phytosanitaire des "PAYS DE LA LOIRE"

Les Ingénieurs chargés des Avertissements Agricoles:

J. DIXMERAS

R. GEOFFRION - J. BOUCHET

TIRAGE DU 25 MAI 1973